

2007年2月改訂

第3類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

のどの殺菌・消毒、口臭除去に ポビドンうがい薬

「ポビドンうがい薬」は、有効成分のポビドンヨードが、のどの殺菌・消毒、口臭の除去にすぐれた効果を発揮します。

すぐれた防臭効果によって口臭を除去し、口の中を清浄にします。

スッキリ味で、ご使用後、清涼感が得られます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起りやすくなります)

次の人は使用しないこと

本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
口内のひどいただれ。
 - 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害。

- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	悪心
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能又は効果

口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

用法及び用量

1回、本剤2～4mLを、約60mLの水でうすめて、1日数回うがいしてください。
専用のコップをかたむけ、目盛りにあわせて薬剤を入れます。
コップを水平にもどし、上部の水平の線まで
水を入れると、約60mLになります。

フタを「カチッ!」と
音がするまで開くと
フタがロックされます。



用法及び用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) うがい用にのみ使用してください。
- (3) 本品は使用するときのみ希釈し、うすめた液は早目に使用してください。

成分及び分量

1mL 中

ポピドンヨード……………70mg (有効ヨウ素7mg)

添加物 サッカリンナトリウム水和物、*l*-メントール、ユーカリ油、
無水エタノール、濃グリセリン、マクロゴール 400、
ヨウ化カリウム、香料

成分及び分量に関連する注意

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に
密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因に
なったり品質が変わります。)
- (4) 衣類に付着したときは、水で洗い流してください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は使用しないで下さい。
(使用期限はボトル底面に記載)

玉川衛材(株)お客様相談窓口
TEL03-3861-2037
受付時間:平日9:00-17:00(土・日・祝を除く)

副作用被害救済制度
TEL0120-149-931

製造販売元

 **タマガワ**
玉川衛材株式会社
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-2-16



ホームページ
<http://www.tamagawa-eizai.co.jp>